

• Измеряйте артериальное давление на протяжении периода от

3 (минимум) до 7 дней (предпочтительно) до посещения вами врача.

Полное имя:

Инструкции

Дневник измерения артериального давления

Необходимо измерять давление дважды в день, проводя при этом каждый раз два измерения с интервалом в одну минуту. Проводите два измерения утром перед приемом лекарства и пищи и два измерения вечером перед сном. За 30 минут до измерения давления не следует курить, употреблять кофеиносодержащие напитки и алкоголь, а также заниматься физической активностью. Используйте валидированный аппарат с манжетой подходящего размера. Перед измерением давления опорожните мочевой пузырь.			• Д п м • 3	 ноги. Посидите спокойно более 5 минут и не разговаривайте. Для измерения артериального давления положите руку на ровную поверхность так, чтобы манжета находилась на уровне сердца. Наденьте манжету на голую руку (не поверх одежды) выше локтевого сгиба. Записывайте результаты измерений артериального давления в этот дневник и показывайте его врачу на каждом визите. 			
ДАТА	УТРО	ВЕЧЕР		ДАТА	УТРО	ВЕЧЕР	
			<u> </u>				
			_				

Мое нормальное артериальное давление: _____ мм рт. ст.

спиной к спинке стула, обе ступни поставьте на пол, не скрещивайте

• Для получения точного результата сядьте прямо, прислонившись